

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Feminella Vagi C
Comprimate vaginale

COMPOZIȚIE

Un comprimat vaginal conține: vitamina C (acid ascorbic) 250 mg, rășină de silicon, lactoză monohidrat, hidroxipropilmetilceluloză, stearat de magneziu.

UTILIZARE

Feminella Vagi C comprimate vaginale sunt create pentru a oferi o protecție naturală a mediului vaginal prin menținerea sau refacerea pH-ului fiziologic. Aplicarea Feminella Vagi C comprimate vaginale normalizează rapid mediul vaginal, făcându-l impropriu pentru creșterea germenilor anaerobi nedorți care sunt responsabili pentru dezvoltarea vaginozelor bacteriene, chiar și în timpul sarcinii. Feminella Vagi C comprimate vaginale ajută în prevenirea și tratamentul vaginozelor bacteriene. Ele sunt utile mai ales la pacientele cu recidive și după tratamentul tradițional cu antibiotice.

DOZAJ

Introduceți câte un comprimat vaginal zilnic, de preferat seara înainte de culcare. Este recomandat să repetați administrarea timp de cel puțin 6 zile pentru refacerea pH-ului fiziologic și a florei vaginale normale. Dacă este necesar, tratamentul poate fi prelungit sau repetat.

CUM SE UTILIZEAZĂ FEMINELLA VAGI C

Feminella Vagi C comprimate vaginale trebuie introduse adânc în interiorul vaginului. Feminella Vagi C comprimate vaginale protejează mediul vaginal prin eliberarea controlată de vitamina C timp de câteva ore, asigurând astfel o acidifiere prelungită și o normalizare rapidă a pH-ului vaginal.

NU UTILIZAȚI FEMINELLA VAGI C

Dacă sunteți alergică (hipersensibilă) la oricare dintre componentele produsului. Dacă aveți sau suspectați că aveți o infecție vaginală cu o ciupercă (de ex. candidoză), deoarece acidifierea pH-ului vaginal poate contribui la proliferarea acestora.

PRECAUȚII

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A nu se înghiți.

A se păstra în loc răcoros și uscat.

Nu utilizați comprimate deteriorate pentru a evita rănirea accidentală în timpul introducerii.

Feminella Vagi C poate conține mici urme de proteine din lapte de bovine.

SARCINA ȘI ALĂPTAREA

Feminella Vagi C poate fi folosită în siguranță în timpul sarcinii și alăptării.

EFECTE ADVERSE

În cazuri rare, poate apărea o senzație de arsură sau de mâncărime intravaginală. În cazuri izolate, poate apărea hipersensibilitate la unul sau mai multe componente ale produsului; în aceste cazuri, este recomandată oprirea administrării și consultarea medicului.

INTERACȚIUNI

Vitamina C poate afecta determinarea glicozuriei, lactatdehidrogenazei, transaminazelor și bilirubinei.

Vitamina C reduce efectele medicamentelor anticoagulante.

Producător:

POLICHEM S.A., Via Angelo Maspoli 11, 6850 Mendrisio, Elveția



Feminella Vagi C este distribuit în România de:
SC Angelini Pharmaceuticals România SRL
Str. Dr. Carol Davila nr. 9, sector 5, București

Data reviziei: Noiembrie 2018

	Erklärung der Symbole
	Vysvětlení symbolů
	Jelmagyarázat
	Explicarea simbolurilor
	Vysvetlenie symbolov
	Chargencode / Číslo šarže / Gyártási szám: / Număr lot / Číslo šarže
	Verwendbar bis / Použitelné do / Felhasználható: / Data de expirare / Použitelné do
	Hersteller / Výrobce / Gyártó / Producător / Výrobca
	Gebrauchsanweisung beachten / Viz návod k použití / Lásd a használati útmutatót! / Consultați instrucțiunile de utilizare. / Pozri návod na použitie
	Temperaturbegrenzung / Omezení teploty / Megengedett hőmérséklet / Limite de temperatură / Hranice teploty uchovávania
	Trocken aufbewahren / Chránit před vlhkem / Száraz helyen tartandó / A se păstra în locuri ferite de umiditate / Uchovávať v suchu